



Globalfarma

Farmacia & Consultorio

Nº 73003

Nombre: Asseneth Flores Estrada Fecha: 01/12/24
Edad: 39 Peso: 73 Talla: 160 T/A: - F/C: 110 F/R: 17 T: 36.7 Alergias: Complejos

- I). Osetamivir capsular 75mg
- Tomar 1 capsula via oral cada 12 horas. 5 dias.
- II). Ibuprofeno capsular 600 mg
- Tomar 1 capsulas via oral cada 8 horas. 5 dias
- III). Dexloratadina tabletas 5mg
- Tomar 1 tableta via oral cada 12 horas 5 dias.

Av. San Mateo No. 997-2
Fraccionamiento Parque Tesistán Zapopan, Jalisco
Tel: 33 3070 2759 33 2665 2311
Lunes a Domingo 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Dr. Oscar Manuel López Romero
Médico Cirujano Integral
Universidad Cuauhtémoc
Atención a
Niños, Adultos, Enfermedades Crónicas y Control de peso

Prueba rápida para detección cualitativa del Antígeno(Ag)

SARS-CoV-2

Nº Nombre: Asseneth Zorank Flores Estrada Area: Sala Maestros
Fecha de nacimiento 04/01/85 Edad 39 Sexo M F

José Alejandro Vázquez Magaña
Universidad Cuauhtémoc
Cédula: PEJ 1732141

Nombre y firma del Médico

RESULTADO: Negativo

OBSERVACIONES:

QFB. América Castro Zambrano

La prueba cuenta con un 98.04% de sensibilidad y 100% de especificidad. En caso de padecer síntomas y presentar un resultado negativo, es importante realizarse una prueba PCR en tiempo real. Si tu resultado es POSITIVO, se confirma COVID-19, se sugiere PCR confirmatoria como lo indican las recomendaciones internacionales.



Pac.: ASSENETH ZORAIDA FLORES ESTRADA (F 39 A, F.NAC: 04/01/1985)
Dr: A QUIEN CORRESPONDA
F. Alta: 02-DIC-2024 17:03 F. Impresión: 03-DIC-2024 15:53
Estudios Solicitados: Folio: 02122402026
Procedencia: MEDICA INTEGRAL TESTISTAN

ESTUDIO

RESULTADO

UNIDAD

VALOR DE REFERENCIA

ANTICUERPOS ANTI-DENGUE IgG E IgM

IgG	NEGATIVO	NEGATIVO
IgM	NEGATIVO	NEGATIVO
ANTIGENO NS1	NEGATIVO	NEGATIVO

Observaciones:

NOTA: Es posible que algunos pacientes no produzcan niveles detectables de anticuerpos entre los primeros 7 a 10 días después de la infección. Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, se recomienda recolectar una segunda muestra de 3 a 4 días después de haber obtenido la primer muestra.

Muestra: 1 ml de suero sin Hémolisis

Metodo: Immunocromatografia

Usuario que validó: Jose Hector Alonso Sandoval Jacobo

AVISO DE FULI S.S.A. No. 1786 QP8 YOLANDA SANCHEZ CASTRO DOP 2977111 S.S.A. 8570 U.A.S.
ESPECIALIDAD EN HEMATOLOGÍA DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO CED. PROFESIONAL No. 6820031

Juan Manuel No. 1359, Guatlaajera, Jal.
☎ 3826 0395 / 3825 7309



Estos resultados son preliminares. El documento original está disponible en el laboratorio.

